

# ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

- Καταγωγή: Ασία
- Βοτανική ταξινόμηση:
  - Οικ.: Rosaceae
  - *Prunus persica*
  - *Prunus persica* var. *nucipersica* (*Νεκταρινιά*)
- Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς

## ● Βοτανικοί Χαρακτήρες

- Φυλλοβόλο
- Μετρίου μεγέθους αλλά ταχείας ανάπτυξης
- Βραχύβιο (ενώ μπορεί να ζήσει μέχρι 20-30 χρόνια, εμπορικά μέχρι 12-15)

### ➤ Φύλλα

- Απλά, κατ' εναλλαγή, επιμήκη, λογχοειδή, αδενοφόρα

### ➤ Οφθαλμοί

- Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι
- Οι ανθοφόροι εκπτύσσονται πριν από τους ξυλοφόρους και δίνουν ένα άνθος μεγάλο λευκού – ρόδινου χρώματος
- Η ωοθήκη της ροδακινιάς καλύπτεται από χνούδια ενώ της μηλοροδακινιάς όχι




White, simple



White, semi-double



Variegated, white and red



Red, simple




Red, semi-double




Chrysanthemum-like, red,  
semi-double




Pink, semi-double



**Fig. 1.4.** Main growth habit in peach: (a) standard; (b) columnar; (c) upright; (d) compact; (e) weeping; (f) open (from Bassi, 2003).




**Figure 2** Simulations of the peach tree root system in orchard conditions (after the model of Vercambre and Pagès, 1998). A. Main roots (macrorhizae) 2 (left), 3 (center), and 4 (right) years after plantation. B. Top view of these main roots, 4 years after plantation. Forks are the consequence of the reiteration process (see text), which is typical of several tree species. Radial growth, represented by the line width, was simulated using the principles of the pipe model (Shinozaki et al., 1964). Root decay and abscission concerns the fine roots (enlargement) and results in a decrease of the density near the base.



## ➤ Καρπός

- Δρύπη
- Σχήμα σφαιρικό έως πλακέ (Ufo)
- Χαρακτηριστική κοιλιακή ραφή
- Φλοιός λεπτός, διαφόρου χρωματισμού με ρόδινες αποχρώσεις, με χνούδι (ροδακινιά) ή χωρίς (νεκταρινιά),
- σάρκα λευκή ή κίτρινη, συνεκτική ή μαλακή, εκπύρηνη ή συμπύρηνη (δεν αποκολλάται εύκολα από τον πυρήνα), με ή χωρίς κόκκινη απόχρωση γύρω από τον πυρήνα

Οι λευκόσαρκες ποικιλίες θεωρούνται πιο αρωματικές και με ιδιαίτερη γεύση, αλλά πιο ευαίσθητες σε μωλωπισμούς ή και γενικά πιο μαλακές



## ➤ Καρπός

- Το μέγεθος φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τον αριθμό των κυττάρων παρά με το μέγεθός τους
- Προσοχή στην 1<sup>η</sup> φάση (βλ. αραίωμα, λίπανση, πότισμα)
- Βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ μεγέθους οφθαλμού το φθινόπωρο και αριθμού κυττάρων στον καρπό την επόμενη άνοιξη (βλ. λίπανση)

## ➤ Καρπός

- Κονσερβοποιήσιμες – συμπύρηνες
- Σε πρώιμες ποικιλίες μπορεί να παρατηρηθεί ημι-εκπύρηνος χαρακτήρας – δεν προλαβαίνει να αποκολληθεί
- Ο μωλωπισμός είναι χαρακτηριστικό του φλοιού και όχι της συνεκτικότητας της σάρκας

## ➤ Καρπός

- Χρώμα φλοιού – ανθοκυάνες – επηρεάζεται θετικά από έκθεση σε ήλιο
- Ανθοκυάνες πιο εναίσθητες σε θερμοχειρισμούς – κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες ελεύθερες ανθοκυανών γύρω από πυρήνα
- Καροτενοειδή πιο ανθεκτικά σε θερμοχειρισμούς
- Σάκχαρα ~ 9-15 °Brix έως όμως και 20 °Brix
- Οξέα ~ 0.9 – 1.6 % σε μηλικό (ΟΟΟ)
- pH < 4.0
- Στυφή γεύση αν το καλοκαίρι είναι δροσερό


## ➤ Καρπός

- Το μέγεθος σχετίζεται άμεσα με τη ζωηρότητα του βλαστού πάνω στον οποίο φέρεται
- Καρπόδεση ασύμετρη στο μήκος του βλαστού (άλλες ποικιλίες στην άκρη, άλλες στη μέση άλλες στη βάση)
- Τα λεπτοκλάδια σημαντικά για κονσερβοποίησιμες ποικιλίες (μεσαίο-μικρό μέγεθος καρπού επιθυμητό)

## ➤ Καρπός

- Υπάρχουν ελάχιστες ποικιλίες που μπορεί να φαγωθεί ολόκληρος ο καρπός εφόσον το σπέρμα δεν είναι πικρό (!)


ΠΕΤΡΟΫΠΟΥΡΓΟΣ



**Figure 2.** Overview of key orchard factors that influence preharvest peach tree and fruit physiology and affect harvest quality (Adapted from Minas et al. [3]).



NETPOV POYNOV



ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΖΑΚÓ

11 3 2005

ΔΕΤΡΟΥΣΤΟΥΣΟΥ

18 2 2006

NETROV POYKÓV

11 3 2005

21.2.2006



ΔΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΩΝ

ΛΕΤΡΟΩΝ ΡΟΥΣΣΩΝ

18-2-2006

NETPOVPOVPOVPOV

11.3.2005



NETPOYNOV

19 3 2005

DETROV POYNOV

19 3 2005

DETROV

19 3 2005

NETROVSKÝ

24 4 2006

DETROÝ ROYAL

13 4 2005

НЕ ПОЧУВСКОВ

25 5 2006

DETROVPOYNOV

3 5 2005

ΔΕΤΡΟΥΣΤΟΥΣ ΟΥ



ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΥΣΟύ



A close-up photograph of a red rose flower with green leaves and a white rose bud in the background. The word "NETPOV" is written diagonally across the image in red text.

## ● Επικονίαση και γονιμοποίηση

- Οι περισσότερες ποικιλίες αυτογόνιμες (η J.H. Hale – γιαρμάς, είναι αυτόστειρη – στείρο αρσενικό)
- Σημαντικό ρόλο η μέλισσα (χρόνος από επικονίαση σε γονιμοποίηση από 24-48 h έως 12 ημέρες!!)
- Διπλή σιγμοειδή καμπύλη
- Δεν έχει αναφερθεί ποτέ αυτό-ασυμβίβαστο όπως σε άλλα πυρηνόκαρπα
- Η σταυρογονιμοποίηση είναι μόλις 5% (αν και έχουν αναφερθεί και υψηλότερα ποσοστά)

## ● Επικονίαση και γονιμοποίηση

- Ο χρόνος άνθισης καθορίζεται από
  - Ωρες ψύχους για συμπλήρωση ληθάργου και μορφολογικής ανάπτυξης ανθικών μερών
  - Θερμοημέρες για επίτευξη πλήρους άνθισης
- Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ χρόνου άνθισης και χρόνου ωρίμανσης

## ● Επικονίαση και γονιμοποίηση

➤ Στις πρώιμες ποικιλίες η ανάπτυξη των εμβρύων συμπίπτει με τη γρήγορη ανάπτυξη του εξωκαρπίου, με αποτέλεσμα εκφυλισμό εμβρύου (ακατάλληλοι οι σπόροι αυτών των ποικιλιών για παραγωγή σποροφύτων)

## ● Τρόπος καρποφορίας

- Από απλούς ανθοφόρους οφθαλμούς, πλάγια, σε ξύλο της προηγούμενης βλαστικής περιόδου και λιγότερο σε λογχοειδή
- Πρώτες καταβολές ανθέων Ιούλιο - Αύγουστο

## ● Περίοδος καρποφορίας

- Από 2 - 4<sup>o</sup> χρόνο και αξιόλογη παραγωγή έως και 15<sup>o</sup> χρόνο

## ● Ριζικό σύστημα

- μέχρι 50-60 εκ (εξαρτάται από υποκείμενο, εδαφικές και καλλιεργητικές συνθήκες)

# ΑΥΞΗΣΗ

- Κατά την έξοδο από το λήθαργο η πρώτη ανάπτυξη στηρίζεται στους αποθηκευμένους υδατάνθρακες (εξόζες κυρίως) που διακινούνται μέσω του ξύλου
- Πολύ σημαντικός ο ρόλος των αποθεμάτων
- Δημιουργούνται μετά τη συγκομιδή με μεταφορά φωτοσυνθετικών υλικών σε κλάδους κτλ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΟΙΠΟΝ Η  
ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ!!

# ΑΥΞΗΣΗ

- Αργότερα ενεργοποιείται ο ηθμός και διακινεί κυρίως σορβιτόλη και σακχαρόζη
- Κύριοι υδατάνθρακες για ανάπτυξη
  - Καρπού: σακχαρόζη
  - Βλαστική ανάπτυξη και ρίζας: σορβιτόλη

# ΑΥΞΗΣΗ

- Το χειμώνα συσσωρεύεται άμυλο στους ιστούς
- Υδρολύεται όμως κατά τη διάρκεια του χειμώνα
- Η σορβιτόλη κυρίαρχο σάκχαρο το χειμώνα στους βλαστούς και μειώνεται την άνοιξη με την άνοδο των γλυκόζη και φρουκτόζη
- Η αφαίρεση καρπών από έναν βραχίονα δεν επηρεάζει καρπούς άλλου βραχίονα ούτε το αντίστοιχο τμήμα ρίζας – αυξάνει όμως τη διάμετρο του βραχίονα

# ΑΥΞΗΣΗ

- Υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ αναπτυσσομένων οργάνων (ρίζα, βλαστοί, καρποί)
- Σε όψιμες ποικιλίες ξεκινάει η αύξηση ρίζας και βλαστού, ακολουθεί ο καρπός και επανέρχεται μετά τη συγκομιδή η ρίζα και ο βλαστός
- Σε πρώιμες ποικιλίες υπάρχει όμως έντονος ανταγωνισμός
- Σε πρώιμες πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα όσον αφορά θρέψη

# ΑΥΞΗΣΗ

- Υπάρχει μοντέλο ανάπτυξης PEACH
- Πλέον ανάπτυξη σε θερμοκήπια για υπερ-πρώιμη παραγωγή

ΠΕΤΡΟΫΠΟΥΡΓΟΥ


- Ανάπτυξη δένδρου
  - Κλίμακες ανάπτυξης για αντικειμενικό στάδιο

ΠΕΤΡΟΥΣ ΡΟΥΣ

## Phenological stages



Dormant bud



Bud swell



Pink stage



Early bloom



Full bloom




Late bloom



Petal fall



Split-jacket



Fruit set



i

*Small fruitlets (cell division)*



k

*Pit hardening*



l

*Final swell*



m

*Fruit veraison*



n

*Commercial ripening*



o

*Physiological ripening*

НЕ ПОКУПАЙ

# Stone fruit

Meier et al., 1994

## Phenological growth stages and BBCH-identification keys of stone fruit

(cherry = *Prunus cerasus* L., plum = *Prunus domestica* L. ssp. *domestica*,  
peach = *Prunus persica* Batsch., apricot = *Prunus americana* L.)

Code	Description
<b>Principal growth stage 0: Sprouting/Bud development</b>	
00	Dormancy: leaf buds and the thicker inflorescence buds closed and covered by dark brown scales
01	Beginning of bud swelling (leaf buds); light brown scales visible, scales with light coloured edges
03	End of leaf bud swelling: scales separated, light green bud sections visible
09	Green leaf tips visible: brown scales fallen, buds enclosed by light green scales
<b>Principal growth stage 1: Leaf development</b>	
10	First leaves separating: green scales slightly open, leaves emerging
11	First leaves unfolded, axis of developing shoot visible
19	First leaves fully expanded
<b>Principal growth stage 3: Shoot development 1</b>	
31	Beginning of shoot growth: axes of developing shoots visible
32	Shoots about 20% of final length
33	Shoots about 30% of final length
3.	Stages continuous till . . .
39	Shoots about 90% of final length
<b>Principal growth stage 5: Inflorescence emergence</b>	
51	Inflorescence buds swelling: buds closed, light brown scales visible
53	Bud burst: scales separated, light green bud sections visible
54	Inflorescence enclosed by light green scales, if such scales are formed (not all cultivars)
55	Single flower buds visible (still closed) borne on short stalks, green scales slightly open
56	Flower pedicel elongating; sepals closed; single flowers separating
57	Sepals open: petal tips visible; single flowers with white or pink petals (still closed)
59	Most flowers with petals forming a hollow ball

# Stone fruit

Meier et al., 1994

## Phenological growth stages and BBCH-identification keys of stone fruit

Code	Description
------	-------------

### Principal growth stage 6: Flowering

- 60 First flowers open
- 61 Beginning of flowering: about 10% of flowers open
- 62 About 20% of flowers open
- 63 About 30% of flowers open
- 64 About 40% of flowers open
- 65 Full flowering: at least 50% of flowers open, first petals falling
- 67 Flowers fading: majority of petals fallen
- 69 End of flowering: all petals fallen

### Principal growth stage 7: Development of fruit

- 71 Ovary growing; fruit fall after flowering
- 72 Green ovary surrounded by dying sepal crown, sepals beginning to fall
- 73 Second fruit fall
- 75 Fruit about half final size
- 76 Fruit about 60% of final size
- 77 Fruit about 70% of final size
- 78 Fruit about 80% of final size
- 79 Fruit about 90% of final size


### Principal growth stage 8: Maturity of fruit and seed



- 81 Beginning of fruit colouring
- 85 Colouring advanced
- 87 Fruit ripe for picking
- 89 Fruit ripe for consumption: fruit have typical taste and firmness

### Principal growth stage 9: Senescence, beginning of dormancy

- 91 Shoot growth completed; foliage still fully green
- 92 Leaves begin to discolour
- 93 Beginning of leaf fall
- 95 50% of leaves discoloured or fallen
- 97 All leaves fallen
- 99 Harvested product

# Stone fruit





# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ – UPOV ή CPVO

		English	français	deutsch	español	Example Varieties/ Exemples/ Beispielssorten/ Variedades ejemplos	Note/ Nota
1. (*)	VG	Tree: size	Arbre : taille	Baum: Größe	Árbol: tamaño		
QN	(a)	very small	très petit	sehr klein	muy pequeño	Bonanza, Bonfire, Pix Zee, Zaino	1
		small	petit	klein	pequeño	Richaven	3
		medium	moyen	mittel	mediano	Robin	5
		large	grand	groß	grande	Redhaven	7
		very large	très grand	sehr groß	muy grande	Champion	9
2.	VG (+)	Tree: vigor	Arbre : vigueur	Baum: Wuchsstärke	Árbol: vigor		
QN		weak	faible	gering	débil	J. H. Hale	3
		medium	moyenne	mittel	medio	Robin	5
		strong	forte	stark	fuerte	Springtime	7
3. (*) (+)	VG	Tree: habit	Arbre : port	Baum: Wuchsform	Árbol: porte		
QN	(a)	fastigate	fastigié	sehr aufrecht	fastigiado	Nectarose, Pillar	1
		upright	dressé	aufrecht	erecto	Fairhaven, Redwing	2
		upright to spreading	dressé à étalé	aufrecht bis breitwüchsig	erecto a extendido	Albertina, Elegant Lady, Mercil	3
		spreading	étalé	breitwüchsig	extendido	Charles Roux	4
		drooping	retombant	überhängend	colgante	Biancopendulo	5

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ – ΥΠΟV ή CPVO

32. (*)	VG	Fruit: size	Fruit : taille	Frucht: Größe	Fruto: tamaño		
QN	(f)	very small	très petit	sehr klein	muy pequeño	Nectarine-Cerise	1
		small	petit	klein	pequeño	Minastar, Springtime	3
		medium	moyen	mittel	mediano	Momée, Springlady, Sunhaven	5
		large	grand	groß	grande	Loring, Zaifer, Zaitabo	7
		very large	très grand	sehr groß	muy grande	Comanche, Maillarbig	9
33. (*) (+)	VG	Fruit: shape (in ventral view)	Fruit : forme (vue ventrale)	Frucht: Form (in Bauchansicht)	Fruto: forma (en vista ventral)		
PQ	(f)	broad oblate	aplati large	breit abgeflacht	achatado ancho	Alex, Bailou, UFO3	1
		medium oblate	moyennement aplati	mittel abgeflacht	achatado medio	Herastrau, Robin	2
		circular	rond	rund	circular	Redwing	3
		broad elliptic	elliptique large	breit elliptisch	elíptico ancho	Cavalier	4
		medium elliptic	moyennement elliptique	mittel elliptisch	elíptico medio	Elberta	5

- Σχίσιμο πυρήνων – έκκριση κόμμεος
  - Συνθήκες που ευνοούν τη γρήγορη ανάπτυξη  
ου καρπού ευνοούν το σχίσιμο του πυρήνα
    - Δακτυλίωση
    - Ορμόνες
    - Πότισμα, λίπανση
  - Τα έμβρυα εκφυλίζονται
  - Έκκριση κόμμεος συνοδεύει πολλές φορές το  
σχίσιμο του πυρήνα
  - Έκκριση κόμμεος περιφερειακά του καρπού δε  
συνδέεται με το σχίσιμο του πυρήνα  
(εντομολογική προσβολή, μικροοργανισμοί  
κτλ)

## ● Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα

### ➤ Το υποκείμενο επηρεάζει

- Την ανάπτυξη του δένδρου
- Το σχήμα μόρφωσης
- Την ποιότητα του καρπού
- Τη θρεπτική κατάσταση του δένδρου
- Επαναφύτευση
- Την ανθεκτικότητα σε εδαφοκλιματικές συνθήκες
  - Ασβεστολιθικά εδάφη (υψηλό ανθρακικό ασβέστιο)
  - Ασφυξία ριζών από νεροκράτημα
  - Βιοτικούς παράγοντες

Rootstock	Trunk cross-sectional area (2016, cm <sup>2</sup> )	Root suckers (no./tree, 2009-16)	Canopy spread (2016, cm)	Cumulative yield per tree (2011-15, kg)	Cumulative yield efficiency (2011-15, kg/cm <sup>2</sup> )	Average fruit weight (2011-15, g)
Atlas	210 ab	0.1 b	464 ab	109 a	0.62 d	188 a
Brights Hybrid 5	178 b	0.0 b	441 abc	105 a	0.66 d	181 a
Controller 5	75 c	0.0 b	369 de	57 b	1.02 bc	172 a
Guardian	248 a	0.6 b	487 a	121 a	0.59 d	190 a
HBOK 10	182 b	0.5 b	422 bc	113 a	0.83 cd	182 a
HBOK 32	173 b	0.9 b	433 bc	116 a	0.81 cd	179 a
KV010-123	192 b	0.0 b	459 abc	117 a	0.78 cd	181 a
KV010-127	195 b	1.5 b	466 ab	119 a	0.71 cd	184 a
Krymsk 1	89 c	7.1 b	345 e	103 a	1.32 ab	186 a
Krymsk 86	207 ab	0.0 b	459 abc	100 a	0.59 d	180 a
Lovell	215 ab	0.0 b	449 abc	123 a	0.67 d	186 a
Mirobac	182 b	4.9 b	444 abc	108 a	0.74 cd	176 a
<i>Prunus americana</i>	99 c	187.0 a	412 cd	125 a	1.50 a	188 a
Penta	184 b	15.0 b	411 cd	94 a	0.60 d	186 a
Viking	202 ab	0.6 b	454 abc	120 a	0.72 cd	184 a

NET PROFIT

## ● Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα

### ➤ Ασβεστολιθικά εδάφη

- GF 677
- Cadaman
- MrS 2/5
- Adesoto 101
- Garnem
- Mirrared (10% a.c.)

### ➤ Ασφυξία ριζών

- Penta
- Tetra
- Adesoto 101
- Krymsk 1

### ➤ Παγετός

- Krymsk 1 (κυρίως δαμασκηνιά)
- Krymsk 2 (κυρίως δαμασκηνιά)
- Krymsk 86

### ➤ Επαναφύτευση

- GF 677
- Cadaman
- Barrier 1
- κ.ά.

## ● Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα

### ➤ Νηματώδεις – προσοχή σε ποιου νηματώδη!!

- Guardian
- Barrier 1
- Tetra
- Penta
- Adesoto 101
- Garnem
- Ishthara
- Nemaguard
- Nemared
- Mirrared

### ➤ Μύκητες εδάφους

- Ishthara (*A. mellea*)

## ● Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα

### ➤ Νέα υποκείμενα από Ισπανία

- Rootpac σειρά
- Rootpac 90
- Rootpac 70
- Rootpac 40
- Rootpac 20 (νάγο για υπέρυκνες φυτεύσεις)
- Rootpac R

**Table 8.1.** Commercial peach rootstock cultivars and their reported horticultural characteristics.

Rootstock cultivar <sup>a</sup>	Origin (country) <sup>b</sup>	Species code <sup>c</sup>	Vigour rating <sup>d</sup>	Cold hardiness <sup>e</sup>	Nematode resistance			Tolerance to wet soils <sup>i</sup>	Alkaline soil tolerance
					Mi/Mj <sup>f</sup>	Ppv <sup>g</sup>	Mx <sup>h</sup>		
'GF 305'	France	1	2	No	3	3	3	2	No
'Montclar®'	France	1	2	No	3	3	3	2	Some
'Rubira®'	France	1	3	No	3	2	2	2	Maybe
'P.S.B2'	Italy	1	2	No	1	2	?	2	No
'Lovell', 'Halford'	USA	1	2	No	3	2	2	2	No
'Nemaguard'	USA	1	1	No	1	2	3	2	No
'Guardian®'	USA	1	1	No	1	2	2	2	No
'Bailey'	USA	1	3	Yes	3	2	3	2	No
'Siberian C'	Canada	1	3	Yes	3	3	3	3	No
'GF 677'	France	2	1	No	3	3	3	3	Yes
'Adafuel'	Spain	2	1	No	3	3	?	3	Yes
'Garnem'	Spain	2	1	No	1	3	3	3	Yes
'Felinem'	Spain	2	1	No	1	2	?	3	Yes
'Adarcias'	Spain	2	2	No	3	3	?	3	Yes
'Sirio'	Italy	2	3	No	3	3	?	3	Yes
'Castore', 'Polluce'	Italy	2	2	No	?	?	?	3	Yes
'Hansen 2168', 'Hansen 536'	USA	2	1	No	1	2	3	3	Yes
'Nickels'	USA	2	1	No	1	1	3	3	Yes
'Penta'	Italy	3	1	No	1	2	2	1	Yes
'Tetra'	Italy	3	2	No	1	3	3	1	Yes
'Mr.S. 2/5'	Italy	4	3	No	1	3	3	1	Yes
'Krymsk® 86'	Russia	5	2	Yes	3/1	1	?	1	Yes

Rootstock cultivar <sup>a</sup>	Origin (country) <sup>b</sup>	Species code <sup>c</sup>	Vigour rating <sup>d</sup>	Cold hardiness <sup>e</sup>	Nematode resistance			Tolerance to wet soils <sup>f</sup>	Alkaline soil tolerance
					Mi/Mj <sup>g</sup>	Ppv <sup>g</sup>	Mx <sup>h</sup>		
'Krymsk® 1'	Russia	6	3	Yes	3	2	3	1	Yes
'Krymsk® 2'	Russia	7	4	Yes	3	2	?	2	Some
'Adesoto 101'	Spain	8	3	No	1	3	3	1	Yes
'Montizo'	Spain	8	3	No	1	3	3	1	Yes
'Julior®'	France	9	3	No	1	3	3	1	Some
'Pumiselect®'	Germany	10	3	Yes	1	3	2	3	No
'Barrier 1'	Italy	11	1	No	1	2	3	1	Yes
'Cadamon®'	France	11	2	No	1	3	3	1	Yes
'Ishtara®'	France	12	3	No	1	3	3	2	No
'Myran®'	France	12	1	No	1	?	3	1	No
'Controller 5'	USA	13	4	No	3	3	3	3	No
'Viking'	USA	14	1	No	1	1	2	1	Yes

<sup>a</sup>Additional testing of compatibility with peach cultivars is advised for 'Ishtara®', 'Krymsk® 1' and 'Krymsk® 2'. Excessive suckering may occur with 'Adesoto 101' and 'Julior®'.

<sup>b</sup>Country of origin and/or initial testing.

<sup>c</sup>Species type: 1, *Prunus persica*; 2, *Prunus dulcis* × *P. persica*; 3, *Prunus domestica*; 4, *Prunus cerasifera*; 5, *P. cerasifera* × *P. persica*; 6, *Prunus tomentosa* × *P. cerasifera*; 7, *Prunus incana* × *P. tomentosa*; 8, *Prunus insititia*; 9, *P. insititia* × *P. domestica*; 10, *Prunus pumila*; 11, *P. persica* × *Prunus davidiana*; 12, (*P. cerasifera* × *Prunus salicina*) × *P. persica*; 13, *P. salicina* × *P. persica*; 14, unknown interspecific cross.

<sup>d</sup>1, vigour similar to 'GF 677' or 'Nemaguard'; 2, vigour similar to 'Lovell'; 3, vigour 5–25% less than 'Lovell'; 4, vigour at least 30% less than 'Lovell'.

<sup>e</sup>Rootstock is considered to have better cold hardiness than 'Lovell'.

<sup>f</sup>Resistance to root-knot nematodes (*Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*): 1, immune or resistant; 2, moderately resistant or some tolerance; 3, susceptible; ?, unknown.

<sup>g</sup>Resistance to root-lesion nematode (*Pratylenchus penetrans* or *Pratylenchus vulnus*): 1, immune or resistant; 2, moderately resistant or some tolerance; 3, susceptible; ?, unknown.

<sup>h</sup>Resistance to ring nematode (*Mesocricotina xenoplax*): 1, immune or resistant; 2, moderately resistant or some tolerance; 3, susceptible; ?, unknown.

<sup>i</sup>Tolerance of fine-textured soils when waterlogged: 1, good; 2, fair; 3, poor.

Table 1. List of evaluated rootstocks in this study, description and origin.

Rootstock	Species	Type	Genetic Background	Origin <sup>a</sup>	Calcareous Soil T <sup>b</sup>	Waterlogging T <sup>b</sup>	References
"Adafuel®"	<i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i>	Vigorous	Open-pollinated	CSIC, Spain	HT	S	Moreno et al. [26]
"Adarcias®"	<i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i>	Semi-vigorous	Open-pollinated	CSIC, Spain	T	MT	Moreno et al. [26]
"Adesoto® 101"	<i>P. insititia</i>	Semi-vigorous	Open-pollinated	CSIC, Spain	HT	HT	Moreno et al. [27]
"Cadamán®"	<i>P. persica</i> × <i>P. davidiana</i>	Vigorous	Controlled cross	INRA, France	T	MT	Edin and Garcin [28]
"Garnem®"	<i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i>	Vigorous	Controlled cross	CITA, Spain	HT	S	Felipe [29]
"GF 677"	<i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i>	Vigorous	Open-pollinated	INRA, France	HT	S	Bernhard and Grassely [30]
"PADAC 04-01"	<i>P. cerasifera</i> × ( <i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i> )	Vigorous	Controlled cross	CSIC, Spain	HT	HT	Moreno [9]
"PADAC 04-03"	<i>P. cerasifera</i> × ( <i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i> )	Vigorous	Controlled cross	CSIC, Spain	HT	HT	Moreno [9]
"PADAC 99-05"	<i>P. cerasifera</i> × ( <i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i> )	Vigorous	Controlled cross	CSIC, Spain	HT	HT	Moreno [9]
"PADAC 9902-01"	( <i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i> ) × ( <i>P. persica</i> × <i>P. davidiana</i> )	Vigorous	Controlled cross	CSIC, Spain	HT	HT	Moreno [9]
"Penta"	<i>P. domestica</i>	Semi-vigorous	Open-pollinated	CRF, Italy	T	T	Nicotra and Moser [31]
"PM 44 AD"	<i>P. insititia</i>	Semi-vigorous	Open-pollinated	CSIC, Spain	T	T	Moreno [9]
"PM 105 AD"	<i>P. insititia</i>	Semi-vigorous	Open-pollinated	CSIC, Spain	T	T	Moreno [9]
"PM 150 AD"	<i>P. insititia</i>	Semi-vigorous	Open-pollinated	CSIC, Spain	T	T	Moreno [9]
"Rootpac® 70"	<i>P. persica</i> × ( <i>P. amygdalus</i> × <i>P. persica</i> )	Vigorous	Controlled cross	AI, Spain	HT	MT	Jiménez et al. [20]
"Rootpac® R"	<i>P. cerasifera</i> × <i>P. amygdalus</i>	Vigorous	Controlled cross	AI, Spain	HT	HT	Pinochet [32]

<sup>a</sup> AI = Agromillora Iberia S.L. private nursery, Monistrol d'Anoia; CITA = Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, Zaragoza; CRF = Centro di Ricerca per la Frutticoltura, Rome; CSIC = Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza; INRA = Institut National de la Recherche Agronomique, Villenave d'Ornon Cedex. <sup>b</sup> Information obtained from different authors [9,16,17,33,34]. Abbreviations: HT, highly tolerant; T, tolerant; S, susceptible; MT, moderately tolerant.

Table 1. Rootstocks used for the peach graft compatibility study.

Rootstock <sup>x</sup>	Species	Origin
<i>Euamygdalus</i> subgenus		
Adafuel	<i>P. dulcis</i> × <i>P. persica</i>	CSIC, Spain
Adarcias	<i>P. dulcis</i> × <i>P. persica</i>	CSIC, Spain
GF 677	<i>P. dulcis</i> × <i>P. persica</i>	INRA, France
H × M 4	<i>P. dulcis</i> × <i>P. persica</i>	AC, Spain
Hansen 2168	<i>P. dulcis</i> × <i>P. persica</i>	UC, USA
Hansen 536	<i>P. dulcis</i> × <i>P. persica</i>	UC, USA
PAC 960, PAC 9501, PAC 9917–01	<i>P. dulcis</i> × <i>P. persica</i>	AC, Spain
Barrier	<i>P. persica</i> × <i>P. davidiana</i>	CNR, Italy
Cadaman Avimag <sup>y</sup>	<i>P. persica</i> × <i>P. davidiana</i>	INRA, France
Benasque	<i>P. persica</i>	CSIC, Spain
Missour	<i>P. persica</i>	Unknown, Morocco
Slow-growing plums		
Adesoto 101 <sup>y</sup>	<i>P. insititia</i>	CSIC, Spain
Pollizo de Murcia: PM 44 AD, PM 95 AD, PM 101 AD, PM 105 AD, PM 137 AD, PM 140 AD, PM 150 AD	<i>P. insititia</i>	CSIC, Spain
PAC 952	<i>P. insititia</i> ?	AC, Spain
PP-1	<i>P. domestica</i> ?	AC, Spain
St Julien GF 655–2	<i>P. insititia</i>	INRA, France
Tetra	<i>P. domestica</i>	ISF, Italy
Fast-growing plums		
Marianna 2624	<i>P. cerasifera</i> × <i>P. munsoniana</i>	UC, USA
Marianna 4001	<i>P. cerasifera</i> × <i>P. munsoniana</i>	UC, USA
Myrobalan 29 C	<i>P. cerasifera</i>	GB, USA
Myrobalan P 1079, Myrobalan P 2980, Myrobalan P 3293	<i>P. cerasifera</i>	INRA, France
Myrobalan P 2175	<i>P. cerasifera</i>	Unknown, Romania
Interspecific hybrid plums		
Bruce	<i>P. salicina</i> × <i>P. angustifolia</i>	Texas A&M, USA
Damas GF 1869	<i>P. domestica</i> × <i>P. spinosa</i>	INRA, France
Evrica	( <i>P. besseyi</i> × <i>P. salicina</i> ) × <i>P. cerasifera</i>	KEBS, Russia
Hiawatha	<i>P. besseyi</i> × <i>P. salicina</i>	USDA, USA
Ishtara Ferciana	( <i>P. cerasifera</i> × <i>P. salicina</i> ) × ( <i>P. domestica</i> × <i>P. persica</i> )	INRA, France
Jaspi Fereley <sup>y</sup>	( <i>P. salicina</i> × <i>P. cerasifera</i> ) × <i>P. spinosa</i>	INRA, France
Krymsk-1 <sup>x</sup>	<i>P. tomentosa</i> × <i>P. cerasifera</i>	KEBS, Russia
Miral	<i>P. dulcis</i> × <i>P. cerasifera</i>	CSIC, Spain
Myrobalan GF 3–1	<i>P. cerasifera</i> × <i>P. salicina</i>	INRA, France
PAC 941	<i>P. dulcis</i> × <i>P. cerasifera</i>	AC, Spain
PAC 959	<i>P. domestica</i> × <i>P. insititia</i>	AC, Spain

<sup>x</sup>Next the rootstock.<sup>y</sup>Protected grant by Community Plant Variety Office (CPVO).<sup>x</sup>Submitted to protection in CPVO.

AC, Agrimillora Catalana S.A., private nursery, Spain; CNR, Centro Nacionale della Recerca; CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; INRA, Institut National de la Recherche Agronomique; GB, Gregory Brother's, Calif.; ISF, Instituto Sperimentale per la Frutticoltura; UC, Univ. of California; Texas A&M, Univ. of Texas, College Station; KEBS, Krymsk Experimental Breeding Station. USDA, U.S. Dept. of Agriculture, Mandan, N.Dak.

- Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα
  - Τα νεότερα δεδομένα
    - Νάνα υποκείμενα για υπέρ-πυκνες φυτεύσεις συμπήρων κυρίως



ΠΕΤΡΟΥ


- Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα
  - Έλεγχος ζωηρότητας (% του standard-σποροφύτου ροδακινιάς)
    - Rootpac 40 (65%)
    - Rootpac 20 (40%)
    - Krymsk 1 (50%)
    - Krymsk 2 (40%)
    - Tetra (90%)
    - Ishthara (70%)
    - MrS 2/5 (90%)
- Δένδρα σε νάνα υποκείμενα αποθηκεύουν αποθέματα λίγο περισσότερο (%) στις ρίζες από ότι σε ζωηρά υποκείμενα

Στις ΗΠΑ νέα υποκείμενα, η σειρά Controller


## Relative vigour of peach rootstocks

rootstock	origin	vigour induced	soil type suitability	advantages	disadvantages
GF677	<i>P. persica*</i> <i>P. amygdalus</i>	high	all soil types, dry soils, high active lime	affinity, vigour, high and consistent yield	suffers from waterlogging, susceptible to <i>Armillaria</i> <i>mellea</i> and <i>Agrobacterium</i> <i>tumefaciens</i>
Cadaman® Avimag*	<i>P. persica*P. davidiana</i>	high	all soil types	affinity, vigour, high and consistent yield	few suckers, slow sprouting
Rootpac®-R	<i>P. cerasifera * P. dulcis</i>	high	ideal for replantings and for anoxic and clay soils	productivity, early bearing, fruit size	
Rootpac®-90 Greenpac	( <i>P. persica*P. davidiana)*</i> ( <i>P. dulcis*P. persica)</i>	high	all soil types	yield, fruit size, tolerates chlorosis	suffers from waterlogging
Garnem®	<i>P. amygdalus*P. persica</i>	high	all soil types, also in replanted orchards	resistant to chlorosis and root-knot nematodes	only for varieties with med-low vigour; tolerates waterlogging better than GF677
Montclar® Chanturgue*	peach seedling	high	poor soils	affinity, vigour	only for varieties with med-low vigour
Adesoto® 101 Puebla*	selection of <i>P. insititia</i>	medium (~20% GF677)	replanted orchards	tolerates <i>A. mellea</i>	low vigour in early years
Rootpac®-70 Redpac	( <i>P. persica*P. davidiana)*</i> ( <i>P. dulcis*P. persica)</i>	medium (~20% GF677)	all soil types	yield, fruit size, earlier harvest date; (3-7 earlier than GF677) tolerates nematodes	susceptible to <i>Agrobacterium</i> <i>tumefaciens</i>
Rootpac®-40 Nanopac	( <i>P. dulcis*P. persica)*</i> ( <i>P. dulcis*P. persica)</i>	medium-low (~25-30% GF677)	all soil types	yield, fruit size, earlier harvest date (3-7 earlier than GF677)	susceptible to <i>Agrobacterium</i> <i>tumefaciens</i>
Ishtara® Ferciana*	( <i>P. cerasifera*P. salicina)*</i> ( <i>P. cerasifera*P. persica)</i>	medium-low (~30% GF677)	moist fertile soils	earliness, size and colour of fruit	sensitive to high active lime; does not tolerate intense winter cold

### Vigour of peach rootstocks



NETPOV



**Figure 3.** Peach rootstock genotypes and their vigor classification. Vigor classification is bracketed as follows: vigorous rootstocks are >110% the size of Lovell with the size estimated by trunk cross-sectional area (TCSA); standard size rootstocks are 110–90% of Lovell size; semi-dwarfing rootstocks are 60–90% of Lovell and dwarfing rootstocks are <60% the size of Lovell (vigor classification adopted from Reighard et al. [18]).

- Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα
  - Υποκείμενα σπορόφυτα (πλέον ΟΧΙ) –  
στρωμάτωση περί τις 10-12 εβδομάδες στους 3-5 °C
    - ❖ Αμυγδαλιάς
    - ❖ Ροδακινιάς (Elberta, Nemaguard)
    - ❖ Βερικοκκιάς
  - GF 305 – μόνο για ιολογικούς ελέγχους

## ● Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα

➤ Πολλαπλασιάζονται με

➤ Μοσχεύματα (φυλλοφόρα, ξυλοποιημένα)

➤ Καταβολάδες

➤ Ιστοκαλλιέργεια

➤ Ακολουθεί εμβολιασμός στο φυτώριο

ανάπτυξης (συνήθως με Τ μέσα καλοκαιριού

έως τέλη φθινοπώρου – με κοιμώμενο)

➤ **ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΖΩΗΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΥΚΝΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ**

# ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

- Επιτραπέζιο
- Βιομηχανικό ροδάκινο
- Νεκταρίνι
- Πλακέ
- Λευκόσαρκες και κιτρινόσαρκες (και κοκκινόσαρκες πλέον σιγά σιγά)
- Τεράστιο ενδιαφέρον για ποικιλίες χαμηλών ωρών σε ψύχος
- Περί τις 600 νέες ποικιλίες το έτος παγκοσμίως ή/και λιγότερες
- Αλλάζουν συνέχεια

Cultivar	Year of introduction	Crop <sup>a</sup>	Chill <sup>b</sup> (CU)	Flesh type <sup>c</sup>	Flesh colour <sup>d</sup>	FDP <sup>e</sup> (days)	Purpose <sup>f</sup>
'UFSun' (p)	2003	P	100	NM	Y	103	FR
'White Opal'	1998	P	200	M	W	75	FR
'White Satin'	2000	P	250	M	W	75	FR
'Zorrito'	1985	P	275	M	Y	95	OR
University of Florida and Texas A&M University, USA							
'FlordaGrande'	1985	P	50	M	Y	105	FR
'Tropic Blush'	1990	P	200	M	Y	90	FR
'TropicBeauty'	1988	P	150	M	Y	85	FR
'TropicSnow'	1988	P	250	M	W	93	FR
'TropicSweet'	1986	P	175	M	Y	90	FR
University of Georgia, US Department of Agriculture and University of Florida, USA							
'Gulfking' (p)	2004	P	350	NM	Y	73–80	FR
'Gulfprince' (p)	2000	P	375	NM	Y	94	FR
University of Western Sydney, Richmond, New South Wales, Australia							
'Dawn Gold' (p)	2003	N	200–300	M	Y	109	FR
'December Ice' (p)	2003	N	350	M	W	129	FR
'Hail' (p)	2003	N	200–300	M	W	106	FR
'Honey Ice' (p)	2003	N	400	M	W	128	FR
'Pale Ice' (p)	2003	N	250–300	M	W	113	FR
Zaiger Genetics, Inc., Modesto, California, USA							
'April Glo' (p)	1990	N	150	M	Y	<90	FR
'Earliglo' (p)	1990	N	150	M	Y	<90	FR
'Earlitreat' (p)	1997	P	300	M	Y	<90	FR
'Evas Pride' (p)	1991	P	250	M	Y	<90	FR
'Mayglow' (p)	1984	N	200	M	Y	<90	FR
'Red Roy' (p)	2001	N	300	M	Y	<90	FR
'Snow Angel' (p)	2004	P	250	M	W	<90	FR
'Zee Fire' (p)	2003	N	250	M	Y	<90	FR

<sup>a</sup>Crop: P, peach; N, nectarine.

<sup>b</sup>Cultivar chilling requirement in chill units (CU); or L, low-chill; M, moderate-chill.

<sup>c</sup>Flesh type: M, melting; NM, non-melting.

<sup>d</sup>Flesh colour: O, orange; W, white; Y, yellow.

<sup>e</sup>FDP: fruit development period in days; or harvest date at place of origin.

<sup>f</sup>Purpose: DU, dual purpose of fresh and processing; FR, fresh; GE, germplasm; OR, ornamental;

PR, processing; RO, rootstock.

(p) patented.


# ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

- Διάφορα μοντέλα για μέτρηση ωρών ψύχους (Utah, ώρες κάτω από 7 °C κτλ)  
<http://www.getchill.net/>
- Ο χρόνος άνθισης εξαρτάται τόσο από τις ώρες ψύχους όσο και από της θερμοημέρες μετά τη λήξη του ενδοληθάργου
- Πολλές οψιμανθείς ποικιλίες που καλλιεργούνται σε περιοχές με λίγες ώρες ψύχους γίνονται μη παραγωγικές
  - λόγω ανεπαρκούς κάλυψης ωρών ψύχους ή/και
  - λόγω χαμηλής καρπόδεσης από υψηλές θερμοκρασίες τη νύχτα κατά την άνθιση

# ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

- Παρατηρούνται λόγω υψηλών μέσων θερμοκρασιών ή υψηλών μέσων θερμοκρασιών το χειμώνα
  - Τυφλοί κόμβοι (χωρίς οφθαλμούς)
  - Πτώση οφθαλμών (και λόγω υψηλών διακυμάνσεων θερμοκρασίας όμως το χειμώνα)

ΠΕΤΡΟΥ



Κάλυψη αναγκών σε ψύχος



# ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

## ● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ - ΠΑΛΙΕΣ

- Mayflower (ΛΣ)
- Springtime (ΛΣ)
- Redhaven
- Fairhaven
- Loring
- Elberta
- J.H. Hale
- Fayette
- Early Crest
- Elegant Lady

# Ροδακινιά – Νεκταρινιά

Κύριες ποικιλίες - Επιτραπέζιες

- Κιτρινόσαρκες

- Λευκόσαρκες

- Πλατύκαρπα (UFO)

ΠΕΤΡΟΝ ΡΟΥΖΟΥ

# Ροδακινιά – Νεκταρινιά

Κύριες ποικιλίες – Επιτραπέζιες - Κιτρούσαρκες

## Ροδακινιά

- May Crest
- Spring Belle
- June Gold
- Royal Summer
- Royal Lee

## Νεκταρινιά

- Early Bomba
- Big Bang
- Big haven
- Big Top
- Venus

ΦΕΤΡΟΥΣ

# Ροδακινιά – Νεκταρινιά

Κύριες ποικιλίες – Επιτραπέζιες - Λευκόσαρκες

## Ροδακινιά

- Amanda
- Maura
- Patty
- Octavia

## Νεκταρινιά

- Queen Globe
- Ryal Queen
- Ruby Bell

ΠΕΤΡΟΥΣ

# Ροδακινιά – Νεκταρινιά

Κύριες ποικιλίες – Επιτραπέζιες - Πλατύκαρπα

## Ροδακινιά

- Ufo 4
- Ufo 3
- PlatiFirst
- PlatiBelle

## Νεκταρινιά

- PlatiNet
- Platerina

ΠΕΤΡΟΩΝ

NETROV BOY



# Ροδακινιά


Κύριες ποικιλίες – Βιομηχανικό ή συμπύρηνο

Το 60% της συνολικής παραγωγής ροδάκινων  
στην Ελλάδα


## Ροδακινιά

- Μιρέλ
- Κατερίνα
- Andross – A37
- Everts
- Romea
- Klampt
- Vivian
- Fortuna


# ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ



# ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ




# ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ




# ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ




# ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ




# ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ



# ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ



**Εποχή ωρίμασης πλατύκαρπων ποικιλιών ροδάκινων και νεκταρινών που έχουν διαδοθεί στην Ισπανία**



**ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  
ΠΛΑΚΕ  
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ**



НЕТРОГРОВЫЙ

# ΚΛΙΜΑ

- Όχι θερμοκρασία κάτω από -15 °C, αλλά θερμοκρασίες < -2.5 °C επικίνδυνες
- Περιοχές με όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς ακατάλληλες
- Μέτριες ανάγκες σε ψύχος (100-1100 ώρες)
- Όταν δεν συμπληρώνονται οι ανάγκες σε ψύχος τότε ψεκασμοί με θειουρία, νιτρικό κάλιο, **σκευάσματα διακοπής ληθάργου, πρόφρη αποφύλλωση, διαβροχή κλαδιών** κτλ
- Σε εύρος θερμοκρασιών 20-32 °C δεν έχουμε μείωση φωτοσύνθεσης

# ΚΛΙΜΑ

- Υψηλές θερμοκρασίες κατά την καρπόδεση οδηγούν σε μειωμένο μέγεθος καρπού και καρποπτώσεις
- Ο λόγος: επιταχύνεται η πρώτη ανάπτυξη, χωρίς όμως τα απαραίτητα εφόδια να είναι διαθέσιμα

ΠΕΤΡΟΫΠΟΥ

# ΕΔΑΦΟΣ

- Ευδοκιμεί σε εδάφη αποστραγγιζόμενα ενώ δεν βαθιά, καλά περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο
- Δεν ανέχεται εδάφη μη αποστραγγιζόμενα
- ΠΡΟΣΟΧΗ – το υποκείμενο και οι ιδιότητές του παίζουν σπουδαίο ρόλο

ΠΕΤΡΟΥ

# ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ


- Προετοιμασία εδάφους
  - Ανάλυση εδάφους
  - Βαθύ όργωμα
  - Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος
  - Προσθήκη οργανικού λιπάσματος είτε σε όλη την έκταση αν είναι εφικτό είτε μεμονωμένα στη θέση φύτευσης
  - Απολύμανση εδάφους
  - Φύτευση δενδρυλλίων

# ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

- Αποσκοπεί:
  - Διατήρηση περιεκτικότητας σε χούμο
  - Αποθήκευση νερού
  - Παρεμπόδιση διάβρωσης
  - Διατήρηση γονιμότητας
  - Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής
- Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από την ακαλλιεργησία, μέσω χημικής ζιζανιοκτονίας ή συνδυασμό καλλιέργειας εδάφους και ζιζανιοκτονίας
- Πρόβλημα επαναφύτευσης (απολύμανση εδάφους, πλούσια λίπανση, GF677 κ.ά.)

# ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

- Σε εδάφη που νεροκρατούν φύτευση σε υπερυψωμένα σαμάρια, τουλάχιστον 70 εκατοστών ύψους και 1-2 μέτρα πλάτους



# ZIZANIOKTONIA

- Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά
- Πριν την εγκατάσταση καλό είναι να έχουμε εξοντώσει πολυετή ζιζάνια
- Τα ζιζάνια μπορεί σε νεαρό ριδακινεώνα να προκαλέσουν μέχρι και 94% απώλειες παραγωγής
- Πολύ σημαντικό να έχουμε καθαρό τον οπωρώνα από την άνοιξη μέχρι λίγες εβδομάδες μετά την καρπόδεση (2-3 μήνες)
- Δίχτυ εδαφοκάλυψης, πλαστικό (χρωματιστό, ανακλαστικό), οργανικό υπόστρωμα, συνθετικό υπόστρωμα (περί τα 10-20 εκ. ύψος)

# ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

- Οι μοντέρνοι οπωρώνες στηρίζονται στην άμεση επίτευξη παραγωγής
- Πυκνά συστήματα φύτευσης με κατάλληλα πλέον υποκείμενα
- Μικρή παραγωγή ανά δένδρο που αντισταθμίζεται από το μεγάλο αριθμό δένδρων
- Σύγχρονες απόψεις
  - Αποφεύγουμε τις πολλές τομές
  - Αποφεύγουμε τομες σύντμησης όπου είναι δυνατόν
  - Χρησιμοποιούμε καλοκαιρινό παρά χειμερινό κλάδεμα για τη μόρφωση των δένδρων
  - Αφήνουμε καρπούς στα δένδρα από τα πρώτα χρόνια όταν είναι εμβολιασμένα πάνω σε ζωηρά υποκείμενα

# ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

- Για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι καλύτερο να παίρνουμε καλά διαμορφωμένα δένδρα
- Κατά τα πρώτα χρόνια ανάλογα με το σύστημα μόρφωσης προχωράμε σε κορυφολογήματα, αραιώσεις και σύντμηση του κεντρικού άξονα ή μη (ναι σε κύπελλα, ύψιλον κτλ, όχι σε κεντρικού άξονα και συναφή)
- Εφαρμογή αλλεπάλληλων κλαδεμάτων το καλοκαίρι (κορυφολογήματα, αφαιρέσεις, επιλογές)
- Καλοκαιρινό κλάδεμα λιγότερο τραυματικό από χειμερινό

# ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ


- Καλοκαιρινό κλάδεμα οδηγεί σε μικρότερης ζωηρότητας αναβλάστηση άρα σε γρήγορότερη είσοδο σε καρποφορία
- Παλαιότερα αφαιρούνταν όλοι οι καρποί κατά τα πρώτα 1-2 χρόνια από τη φύτευση
- Στόχος πλέον έχει αλλάξει – να μπει γρήγορα σε παραγωγή το δένδρο το οποίο θα αντικατασταθεί στα 12-15 χρόνια
- Η παραμονή 4-6 καρπών πάνω στο δένδρο το έτος φύτευσης στόχο έχει να ελέγξει τη ζωηρότητα του δένδρου και όχι να επιτευχθεί παραγωγή – προϋποθέτει την αγορά δένδρων με πλάγια βλάστηση

# ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

- Με τα νάνα υποκείμενα πλέον ο στόχος είναι να γεμίσει το έδαφος του οπωρώνα με φύλλωμα πολύ γρήγορα
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σκίαση οδηγεί σε νεκρώσεις βλαστών
- Στα ζωηρά υποκείμενα υπάρχει δυνατότητα αναβλάστησης από σχετικά σκιαζόμενα μέρη δένδρου, στα νάνα όχι
- Στόχος κατά τη σχεδίαση να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκθεση της κόμης στην ηλιακή ακτινοβολία

# ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

- Έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία με τρεις τρόπους
  - Αύξηση πυκνότητας κόμης (μειωση όμως διείσδησης φωτός στο εσωτερικό)
  - Αύξηση αριθμού δένδρων ανά μονάδα επιφανείας, πάνω σε νάνα υποκείμενα όμως
  - Βελτίωση σχήματος μόρφωσης δένδρου
- Περίπου ένας καλός οπωρώνας δέχεται το 50-60% της ηλιακής ακτινοβολίας
- Σε χαμηλή διείσδυση φωτός παρουσιάζεται και χαμηλή διαφοροποίηση οφθαλμών



**Fig. 11.1.** Light interception pattern for a 9-year-old 'Red Gold' orchard, grafted on clonal seedlings, trained in three different forms: delayed vasette ( $5.0\text{ m} \times 3.7\text{ m}$ ; 545 trees/ha), palmette ( $5.0\text{ m} \times 2.8\text{ m}$ ; 727 trees/ha) and Y-trellis ( $5.0\text{ m} \times 1.6\text{ m}$ ; 1274 trees/ha). The common spacing between rows in this trial was dictated by a drain tile system which had spacing between tiles of 5 m. Light interception was measured once a year, around summer solstice. The slight decreases for all systems after the seventh year are due to reform pruning applied to keep the trees from expanding excessively. (From Corelli-Grappadelli et al., unpublished results.)

**Table 11.1.** A summary of critical light levels (percentage of full sun) for various aspects of peach leaf function and fruit quality.

Parameter	Response to light	Light threshold (% of full sun)	
		Flore and Kesner (1982)	Marini and Sowers (1990); Marini et al. (1991)
Leaf size	Negative	36	40
Leaf thickness	Positive	36	40
Specific leaf weight	Positive	36	40
Maximum CER	Positive	36	35
Cold hardiness	Positive	21	–
Fruit size	Positive	–	10
Fruit colour	Positive	36	30
Soluble solids	Positive	–	50
Flesh firmness	None	–	No response
Flower density <sup>a</sup>	Positive	–	23

CER, carbon exchange rate.

<sup>a</sup>Flower bud formation was most affected by shade during the period 50 to 100 days after bloom.

# ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

- Διερεύνηση σχέσης αριθμού δένδρου με τελική παραγωγή ανά μονάδα επιφανείας
- Πχ για επίτευξη 4 τόνων στο στρέμμα με 200 γρ βάρος καρπού
  - Κύπελλο σε αποστάσεις 4 χ 5 μέτρα = 50 δένδρα/στρέμμα
  - Κεντρικού άξονα σε αποστάσεις 2,0 χ 4 μέτρα = 125 δένδρα/στρέμμα
  - Κύπελλο – 4 τν/50 δένδρα = 80 κιλά/δένδρο → 400 καρποί/δένδρο
  - Κεντρικός άξονας – 4 τν/125 δένδρα = 32 κιλά/δένδρο → 160 καρποί/δένδρο

# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

- Αποστάσεις φύτευσης από 4 - 5 x 2 - 5 μέτρα και πλέον μικρότερες (περί το 1,5 μέτρο επί της γραμμής)
- Φυτεύουμε χωρίς μπάλα χώματος το χειμώνα και με μπάλα χώματος όταν έχουν φύλλα
- Πρόβλημα επαναφύτευσης (GF 667, Cadaman, Garnet κ.ά.)
  - Νηματώδεις
  - Μυκητολογικές ασθένειες
  - pH
  - Θρεπτικά στοιχεία κτλ

## Training systems and tree density

tree form/shape	tree spacing (m)	trees/ha
vase	5-5,5 * 3-4	450-660
palmette	4-4,5 * 3-3,5	630-830
candelabra	4-4,5 * 3-3,5	630-830
Catalan vase	4,5-5 * 2,5-3	670-890
U-shape	4-4,5 * 2-3	740-1250
slender spindle	4,5-5 * 1,5-2	1000-1500
trellised-Y	5 * 1,5	1330
super spindle	4-4,5 * 1-1,2	1850-2500

- Το πλεονέκτημα των πυκνών φυτεύσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλο τα πρώτα χρόνια ζωής του οπωρώνα
- Αργότερα μειώνεται ή και αναστρέφεται
- Σε γενικές γραμμές λόγω της μικρής διάρκειας παραγωγικής ζωής της ροδακινιάς, τα πυκνά συστήματα κερδίζουν έδαφος

**Table 2.** Training systems and their associated orchard design characteristics.

System	No. of Primary Leaders	Spacing (m) (Intra- × Inter-Row)	Trees ha <sup>-1</sup>	Tree Height (m)
Low-Density Planting (LDP)				
Open Vase	3	3.5–5.0 × 4.0–5.0	220–550	2.2–5.0
Medium-Density Planting (MDP)				
Delayed Vasette	4	3.5 × 4.5	600–800	3.0–4.0
Palmette	1	2.0–3.5 × 4.0–4.5	600–900	3.5–4.5
Hex-V	6	3.0 × 4.5	750	2.0–2.5
Quad-V	4	2.5–3.0 × 4.5	900–1000	2.5–3.0
High-Density Planting (HDP)				
Fusetto or Tall Spindle Axe (TSA)	1	1.5–2.0 × 4.0	1250–2000	2.8–3.5
Slender Spindle Axe (SSA)	1	1.2–1.5 × 3.5–4.0	1500–2445	3.0–3.7
Y-Shaped (Bi-Axis, KAC-V)	2	1.5–2.0 × 4.0–4.5	900–2000	3.0–5.5
Cordon Systems	1–2	2.4 × 4.0	900	<2.5
Ultra High-Density Planting (UHDP)				
Meadow Orchard	1–2	0.4–1.0 × 1.3–4.8	2700–19,000	1.5–2.2

Brendon M. Anthony and Ioannis S. Minas

Optimizing Peach Tree Canopy Architecture for Efficient Light Use, Increased Productivity and Improved Fruit Quality

# ΚΛΑΔΕΜΑ

## ● Κλάδεμα μόρφωσης


- Κυπελλοειδές και κυπελλοειδές (πολύ καλύτερο)
- Κανονική και ελεύθερη παλμέττα
- Ατρακτοειδές (κυπαρισσάκι)
- Ύψιλον
- Οπωρώνας τύπου λιβάδι

# Κυπελλοειδές και καθυστερημένο κύπελλο


- 3-5 βραχίονες σπειροειδώς διατεταγμένους
- Κορυφολογήματα και αφαιρέσεις βλαστών κατά το καλοκαίρι
- Ο κεντρικός άξονας αφαιρείται μετά από 3-4 χρόνια στο καθυστερημένο κύπελλο
- Πολλές εφαρμογές κλαδέματος
- Θεωρείται πλεόν ξεπερασμένο – πιο πολύ πλέον σε βιομηχανικό ροδάκινο

*DETROZ POYNO*






DETROV POYNOV



Brendon M. Anthony and Ioannis S. Minas

Optimizing Peach Tree Canopy Architecture for Efficient Light Use, Increased Productivity and Improved Fruit Quality



**Figure 5.** Orchard appearance of six canopy architectures of the most widely used training systems in 'O'Henry' peach trees (grafted on 'Krymsk®86' rootstock) before and after dormant pruning following the 3rd leaf from planting at the Colorado State University's Experimental Orchard at Western Colorado Research Center—Orchard Mesa (WCRC-OM) located in Grand Junction, CO, USA.

Brendon M. Anthony and Ioannis S. Minas

Optimizing Peach Tree Canopy Architecture for Efficient Light Use, Increased Productivity and Improved Fruit Quality

# Κανονική και ελεύθερη παλμέτα

- Σταδιακή διαμόρφωση
- Απαιτεί υποστήλωση
- Να μην ξεπερνά τα 4 μέτρα σε ύψος
- 3-4 σύρματα
- Το καλοκαίρι λογίζονται οι βλαστοί όσο είναι ευλύγιστοι








# Κεντρικού άξονα

- Ένας κύριος κεντρικός άξονας (κορμός) μέχρι 4 μέτρα περίπου
- Πλάγια βλάστηση κατά ορόφους
- Προσοχή στη σκίαση
- Το κορυφαίο τμήμα πιο στενό από το τα βασικό για αποφυγή σκίασης
- Κανόνας του 50%
- Οι καρποφόροι κλάδοι ανανεώνονται κάθε χρόνο
- Όχι τόσο καλό για ροδακινιά λόγω έντονων ξηράνσεων από σκίαση – απαραίτητο το καλοκαιρινό κλάδεμα σε όλη τη ζωή του δένδρου



Κεντρικού άξονα

- Στο νάνο Fusseto ακολουθεί κλάδεμα αμέσως μετά τη συγκομιδή στον πλησιέστερο στον κορμό πλάγιο βλαστό
- Ισχύει για πρώιμες ποικιλίες και περιοχές με μακρά βλαστική περίοδο για να προλάβει το δένδρο να διαφοροποιήσει οφθαλμούς



Fusseto ή  
κυπαρισάκι

## Y ή V

- Δένδρα σε σχήμα Y ή V (το V το σχηματίζουν δύο κοντινά δένδρα στην ίδια γραμμή)
- Υψηλή πρόσπτωση – έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (~70%)
- Υψηλές παραγωγές τα πρώτα χρόνια
- Τα προτιμούν σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (εντός θερμοκηπίων)
- Αποστάσεις περί τα 4-4,5 x 1,2 -1,5 μέτρα (90-150 δένδρα στο στρέμμα)
- Με ποικιλίες πρώιμες, μικρών απαιτήσεων σε ψύχος κλαδεύουμε αμέσως μετά τη συγκομιδή (βλ. Fusseto)





Mature Standard Tree



Mature Slender Spindle (Central Leader)

DETPOV POYNOV





# Καλλιέργεια υπό κάλυψη

- Δένδρα σε σχήμα Y ή V
- Πρώιμες ποικιλίες με μικρές απαιτήσεις σε ψύχος
- Καλό είναι να εφαρμόζεται καλοκαιρινό κλάδεμα για διατήρηση του καρποφόρου ξύλου
- Το θερμοκήπιο κλείνει αμέσως μετά τη συμπλήρωση των αναγκών σε ψύχος
- Ανθίζει περί το Φεβρουάριο
- Ωριμάζει περί τον Απρίλιο
- Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες κατά την ημέρα (άνοιγμα παραθύρων θερμοκηπίου)





НЕ ПОДАВЛЯЙ





ДЕПОЗИТОВ







ДЕПОЗИТОР

# Σημαντικά στοιχεία

- Όσο λιγότερο κλαδεύεται στην αρχή ένα δένδρο τόσο πιο γρήγορα μπαίνει σε παραγωγή
- Τα πρώτα χρόνια πιο υψηλή παραγωγή από τα κλαδεμένα αλλά ισορροπείται αργότερα
- Ζωηρότητα και καρποφορία δεν «πάνε» μαζί
- Απαιτείται έκθεση στον ήλιο για διαφοροποίηση και καλή παραγωγή (ποιοτικά και ποσοτικά)
- Καλοκαιρινά κλαδέματα απαραίτητα πλέον στη σύγχρονη δενδροκομία

**ΌΛΑ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΣΕΙΣ**

## Σημαντικά στοιχεία

- Η μέγιστη παραγωγικότητα επιτυγχάνεται όταν τα δένδρα καλύψουν το χώρο που τους αναλογεί
- Όταν φυτεύουμε δένδρα σε μεγάλες αποστάσεις αντό καθυστερεί
- Η φύτευση μικρών δένδρων, πυκνά, οδηγεί σε πιο γρήγορη κάλυψη του χώρου και άρα μεγαλύτερη παραγωγή τα πρώτα χρόνια
- Όταν τα δένδρα καλύψουν το χώρο που τους αναλογεί ανεξαρτήτου σχήματος, η παραγωγή είναι περίπου ίδια
- Άρα το πλεονέκτημα των πυκνών φυτεύσεων τα επόμενα χρόνια έγκειται στην οικονομικότερη διαχείριση του οπωρώνα

# Σημαντικά στοιχεία

- Τελικά η επιλογή του συστήματος μόρφωσης έχει να κάνει

- Λιγότερο με την παραγωγικότητα του συστήματος και
- Περισσότερο με
  - Εξοπλισμό που έχει ο παραγωγός
  - Δυνατότητα εξεύρεσης εργατικών και κόστος αυτών
  - Ικανότητα εφαρμογής των κλαδεμάτων που απαιτούνται
  - Κόστος αγοράς δένδρων
  - Κόστος εγκατάστασης και διατήρησης των διαφόρων συστημάτων
  - Επίδραση στο μέγεθος καρπού και ποιότητα

# ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

- Σκοπός :
  - Διατήρηση σχήματος
  - Αφαίρεση ξερών κλάδων
  - Ανανέωση καρποφόρου ξύλου
- Από τα δένδρα που ανταποκρίνονται στο κλάδεμα
- Κλάδεμα βραχύ (μεγαλόκαρπες ποικιλίες) , μακρό (μικρόκαρπες) και μικτό
- Γενικά με κλάδεμα κάθε χρόνο ανανεώνεται το καρποφόρο ξύλο χωρίς να γίνονται μεγάλες τομές
- Σημαντικό το καλοκαιρινό κλάδεμα

# ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

- Η πρώτη ανάπτυξη μετά την έκπτυξη βασίζεται στους αποθηκευμένους (υπό μορφή αμύλου) υδατάνθρακες
- Προσοχή στο ποσοστό αφαίρεσης κλαδιών
- Με το κλάδεμα όμως επιτυγχάνεται ένα πρώτο αραίωμα καρπών – πολύ ακριβή καλλιεργητική τεχνική που έτσι ελαττώνουμε το κόστος

# ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

- Εύκολος και γρήγορος τρόπος να επιτύχουμε καλό κλάδεμα
- ΚΛΑΔΕΥΩ ΜΕ:

- N ΝΕΚΡΑ
- A ΑΡΡΩΣΤΑ
- Z ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ
- I ΙΔΙΟΡΥΘΜΑ

# ΠΟΤΙΣΜΑ

- Σημαντική καλλιεργητική τεχνική, απαιτητικό δένδρο
- Έχει αυξημένες ανάγκες σε νερό κατά την περίοδο σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου μέχρι και την ωρίμανση του καρπού (Άνοιξη - Καλοκαίρι)
- Υπολογίζονται σε περίπου 400-600 mm νερού το έτος
- Μειωμένη παροχή νερού κατά μέσα με τέλη καλοκαιριού οδηγεί σε
  - Διπλούς καρπούς τον επόμενο χρόνο
  - Καρπούς με έντονη κοιλιακή ραφή τον επόμενο χρόνο

ΔΙΕΤΡΟΝ ΠΟΥΚΩΣΟΣ



# ΠΟΤΙΣΜΑ

- Ελειμματική άρδευση μόνο κατά τη φάση 2 ανάπτυξης του καρπού
- Μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση νερού αλλά και αυξημένα διαλυτά στερεά στον καρπό
- Εξαρτάται η αποτελεσματικότητα από πολλούς παράγοντες (εδαφοκλιματικούς και ποικιλίας)

# ΛΙΠΑΝΣΗ



Δίνει ενέργεια για τη βλάστηση και την ανάπτυξη των φυτών. Τα δένδρα χρειάζονται αρκετό άζωτο στην αρχή και λιγότερο μετά.



Αντοχή, βιοθά στην ανάπτυξη των ριζών, στην ανθοφορία των λουλουδιών και στην καρποφορία των δένδρων.



Κάνει τα φυτά εύρωστα και δυνατά και επομένως πιο ανθεκτικά στις ασθένειες. Δίνει ποιότητα στους καρπούς των δένδρων (μέγεθος, σχήμα, γεύση, άρωμα).



Αναπνοή, γονιμοποίηση, της απορρόφησης νερού καθώς και στη λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης. Το Βόριο είναι το πιο ουσιαστικό ιχνοστοιχείο για την καλλιέργεια της ελιάς.



Παραγωγή χλωροφύλλης και κατά συνέπεια φωτοσύνθεσης.




Παραγωγή ενέργειας, τη σύνθεση πρωτεΐνων και τη ρύθμιση της ανάπτυξης.

# ΛΙΠΑΝΣΗ



Η απόδοση της παραγωγής καθορίζεται όχι από τα στοιχεία που βρίσκονται σε επάρκεια αλλά από το στοιχείο που βρίσκεται σε έλλειψη



## Μερικές βασικές αρχές της θρέψης φυτών

Amounts of nutrients removed by different fruits

Tree	N	P	K	Ca	Mg	Fe	Mn	Zn
	kg / t of production					g / t of production		
Actinidia	1,3-1,8	0,23	1,9-2,6	0,16-0,5	0,1	2,0-12,0	0,7-23	0,8-3,2
Apricot	0,87	0,19	2,9	0,14	0,08	5,4	0,79	2,6
Chestnut	4,6	0,93	5,2	0,27	0,32	10,1	9,52	5,2
Cherry	2,0-2,3	0,18-0,2	1,5-1,7	0,1-0,16	0,1-0,16	5,6	0,7-1,0	1,8-2,0
Apple	0,5-0,6	0,07-0,13	1,4	0,07	0,05-0,07	1,8	0,45	0,4
Pear	0,65-0,8	0,05-0,13	1,3-1,6	0,11	0,1-0,12	2,5	0,76	1,2
Peach	0,9-1,0	0,25	2	0,05	0,1	1,1	0,47	1,4
Plum tree	0,49	0,1	1,7	0,04	0,07	1	0,49	1
Vine	1,3-1,9	0,3	2,2-2,8	0,14	0,2-0,3	2,9	7,18	0,4

Source: Tagliavini et al., 2000

# ΛΙΠΑΝΣΗ

- Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της θρεπτική κατάστασης των δένδρων
- Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (Ιούλιο) με φύλλα της βάσης του βλαστού
- Απαιτητική σε άζωτο και κάλιο
- Εμπειρικά: 10-15 μονάδες αζώτου, 5-6 μονάδες φωσφόρου (κάθε 2-3 χρόνια) και 15-20 μονάδες καλίου
- Τροφοπενία μαγνησίου, ψευδαργύρου και βορίου (κόμμι), σιδήρου, καλίου

# ΛΙΠΑΝΣΗ

- Κατά τη φύτευση μπορούμε
  - Περικαλυμμένα λιπάσματα αργής αποδέσμευσης
  - Ακολουθούμε ερμηνεία ανάλυσης εδάφους
  - Αποφεύγουμε αζωτούχα λιπάσματα – τα εφαρμόζουμε αργότερα σε δόσεις

# ΛΙΠΑΝΣΗ

• N

- Το πολύ οδηγεί σε βλαστομανία, σκιάσεις και νεκρώσεις και καθυστερεί την ωρίμανση
- Πολύ καλά αποτελέσματα από φθινοπωρινούς ψεκασμούς με ουρία πριν πέσουν τα φύλλα
- Τότε δε μας ενδιαφέρει η φυτοτοξικότητα
- Μπορεί να συνδυαστεί και με Zn
- Δε μπορεί να αντικαταστήσει την εφαρμογή στο έδαφος
- Επικουρικά όμως πολύ καλή
- Περίπου το 50-70% το διαφυλλικά εφαρμοζόμενου τότε μεταφέρεται στα κλαδιά για την πρώτη ανάπτυξη την άνοιξη!!
- Αργής αποδέσμευσης αζωτούχα

Για βλάστηση – φωτοσύνθεση – νουκλεοτίδια κτλ

## Επίδραση του Ν στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του καρπού και το ύψος παραγωγής

N-fertilization treatment (kg N/ha)	Leaf N (%)	Fruit visual redness (%)	Yield (kg/tree)	Fruit weight (g)
0	2.7 <sup>a</sup>	92 <sup>a</sup>	132 <sup>a</sup>	131 <sup>a</sup>
112	3.0 <sup>b</sup>	80 <sup>b</sup>	207 <sup>b</sup>	166 <sup>b</sup>
196	3.1 <sup>c</sup>	72 <sup>c</sup>	193 <sup>b</sup>	168 <sup>b</sup>
280	3.5 <sup>d</sup>	69 <sup>c</sup>	222 <sup>b</sup>	169 <sup>b</sup>
364	3.5 <sup>d</sup>	70 <sup>c</sup>	197 <sup>b</sup>	167 <sup>b</sup>

# ΛΙΠΑΝΣΗ

• P

- Ενέργεια χρειάζεται η καρπόδεση
- Δυσκίνητο στο έδαφος
- Να εφαρμόζεται νωρίς και με ενσωμάτωση
- Υψηλός P μπορεί να προκαλέσει παροδική τροφοπενία Zn
- Όχι όμως τόσο απαιτητικό δένδρο σε P

ΔΕΤΡΟΣ

Για ενέργεια – ριζικό σύστημα

# ΛΙΠΑΝΣΗ

• K

- Δεν έχει βρεθεί ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ K και ποιότητας καρπού
- Φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στα ολικά διαλυτά στερεά, στο χρώμα και την οξύτητα αλλά όχι ξεκάθαρο ρόλο

Μεταφορά υδατανθράκων – στομάτια - καταπονήσεις

• Ca

- Στα κυτταρικά τοιχώματα
- Δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη συνεκτικότητα του καρπού όσο στα μήλα
- Εφαρμογή του μαζί με B για ευκολότερη μεταφορά

Κυτταρικά τοιχώματα

# ΛΙΠΑΝΣΗ

## • Zn

- Σημαντικό ρόλο στη ροδακινιά, σημαντική τροφοπενία
- Παίρνει μέρος στην πρώτη ανάπτυξη
- Εφαρμογές διαφυλλικές με θειικό ψευδάργυρο πριν πέσουν τα φύλλα
- Στο έδαφος και με χηλική μορφή και ως θειικός

Ενζυμικά συστήματα – μεταβολισμό τρυπτοφάνης σε IAA (ανξίνη)

## • Mn

- Αρκετά εναίσθητη η ροδακινιά
- Διαφυλλικές εφαρμογές με θειικό μαγγάνιο την άνοιξη

Ενζυμικά συστήματα – μεταβολισμό τρυπτοφάνης σε IAA (ανξίνη)

# ΛΙΠΑΝΣΗ

• B

- Σημαντικό για την καρπόδεση
- Η ροδακινιά όχι τόσο ευαίσθητη
- Πολύ ευκίνητο σε πυρηγόκαρπα
- Τροφοπενία ως μη έκπτυξη οφθαλμών
- Εφαρμογές πριν πέσουν τα φύλλα

Ενζυμικά συστήματα – γύρη - μεταφορά σακχάρων

• Fe


- Εφαρμογές στο έδαφος με μορφή χηλικών
- Εφαρμογή τέλος χειμώνα – α. άνοιξης
- Επιλογή κατάλληλου υποκειμένου
- Τροφοπενά σε ασβεστούχα εδάφη ή που νεροκρατούν

Ενζυμικά συστήματα – μεταφορά ενέργειας


Nutrient	Deficiency threshold	Sufficiency range
N (%)	2.2–2.4	2.6–3.5
P (%)	0.09–0.12	0.14–0.40
K (%)	0.75–1.0	2.0–3.0
Ca (%)	1.0	1.5–3.0
Mg (%)	0.10–0.30	0.30–0.80
S (%)	0.09	0.14–0.40
Zn (ppm)	10–20	20–50
B (ppm)	15–30	30–70
Fe (ppm)	—	80–250
Mn (ppm)	20	40–200
Cu (ppm)	3	5–16


Όρια επάρκειας και τροφοπενίας στα φύλλα  
100-130 ημέρες μετά την άνθιση από μη καρποφόρους  
βλαστούς

## How soil pH affects availability of plant nutrients.



SOURCE: <https://www.emporiumhydroponics.com/what-is-ph-1-to-14>





Ενδεικτική λίπανση νεαρών δενδρυλλίων, μέχρι την έναρξη της καρποφορίας  
Προτιμάται η κατευθυνόμενη εφαρμογή με το χέρι, σύμφωνα με τα παρακάτω

Αζώτο (N)  
Γραμμάρια ανά Δένδρο, σε 3-5 δόσεις

	Ροδακινιά	Βερικοκιά	Δαμασκηνιά	Κερασιάς
1ο έτος	50-80	50-80	50-80	50-80
2ο έτος	80-150	80-150	80-150	80-150
3ο έτος	200-300	150-250	150-250	150-250

## ● Διαχείριση φορτίου - Αραίωμα καρπών

- Παράγονται χιλιάδες άνθη
- Υπό βέλτιστες συνθήκες καρπόδεση μερικών χιλιάδων
- Αυτό οδηγεί σε
  - Μικροκαρπία
  - Παρενιαυτοφορία
  - Σπασίματα κλάδων
- Απαραίτητο το αραίωμα
  - Κυρίως με το χέρι – δαπανηρό αλλά απαραίτητο
  - Μέσω κλαδέματος καρποφορίας – συντμήσεις στο 50% του μήκους του καρποφόρου κλάδου – περί τα 100 καρποφόρα κλαδιά ανά δένδρο σε κύπελλο.....

## ● Διαχείριση φορτίου - Αραίωμα καρπών

- Με το αραίωμα στόχος να μειώσουμε τον ανταγωνισμό σε θρεπτικά
- Επειδή το μέγεθος του καρπού σχετίζεται με το 2<sup>o</sup> μισό της πρώτης φάσης (κυτταροδιαιρέσεις), το αραίωμα να γίνεται κατά το 1<sup>o</sup> μισό της φάσης αυτής
- Στο τέλος της περιόδου αύξησης του καρπού να μην υπάρχουν παρεμποδίσεις – καταπονήσεις, όταν ο καρπός αυξάνεται πολύ σε μέγεθος για να επιτευχθεί το μέγιστο βάρος

## ● Διαχείριση φορτίου - Αραιώμα καρπών

- Για κάθε επιπλέον καρπό που αφήνουμε στο δένδρο μειώνεται το βάρος των υπολοίπων κατά 0.5-0.6 γραμμάρια

	600 καρποί	3 ποικιλίες	
100γρ	150γρ	220γρ	
Για βάρος καρπού περί τα 130 γρ να αφήσουμε στο δένδρο			
190	1000	2000	
	καρπούς		

## ● Διαχείριση φορτίου - Αραίωμα καρπών

- Αν στόχος είναι συγκεκριμένη παραγωγή στο στρέμμα πχ 4000 κιλά τότε
- Αν έχουμε 40 δένδρα στο στρέμμα, σημαίνει 100 κιλά/δένδρο, με 200 γραμ/καρπό τότε σημαίνει 500 καρπού/δένδρο
- Αν έχουμε όμως 100 δένδρα/στρέμμα, τότε σημαίνει 40 κιλά/δένδρο, με 200 γραμ/καρπό τότε 200 καρπού/δένδρο
- Στη δεύτερη περίπτωση είναι πιο εύκολο το αραίωμα και ο υπολογισμός ακριβώς του αριθμού καρπών/δένδρο

## ● Διαχείριση φορτίου - Αραίωμα καρπών

- Σημαντικότατη τεχνική
- Αναλογία φύλλων καρπών περίπου 35:1
- Ένας καρπός ανά 15-20 εκατοστά
- Στις πρώιμες ποικιλίες πρώιμο αραίωμα (πριν την πτώση Ιουνίου)
- Στις μεσοπρώιμες και όψιμες μετά την πτώση Ιουνίου
- Αφαιρούνται μικροί και ελαττωματικοί καρποί
- Αραίωμα με το χέρι, χημικά, μηχανικά, αλλά καλύτερο με το χέρι ή μέσω κλαδέματος

## ● Αραίωμα καρπών

- Αφήνουμε καρπούς ανά
  - 12 εκατοστά σε μεγαλόκαρπες ποικιλίες
  - 15 εκατοστά σε μεσαίου μεγέθους
  - 20 εκατοστά σε μικρόκαρπες
- Η απόσταση μεταξύ των καρπών πάνω στον κλάδο δε φαίνεται να επηρεάζει το μέγεθός τους – παρόλο που φροντίζουμε να είναι ομοιόμορφα διατεταγμένοι

## ● Αραίωμα καρπών

### – Αφήνουμε



- 2-3 καρπούς ανά βλαστό στο κατώτερο μέρος του δένδρου
- 3-4 καρπούς ανά βλαστό στο μεσαίο μέρος
- 4-5 καρπούς ανά βλαστό στο ανώτερο μέρος

### – Επίσης

- Περί τους 3 καρπούς ανά βλαστό σε πρώιμες ποικιλίες
- Περί τους 4-6 καρπούς ανά βλαστό σε όψιμες ποικιλίες
- Έχει σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία και φωτοσυνθετική ικανότητα



12-20 εκατοστά



# ΩΡΙΜΑΝΣΗ

- Κατά την ωρίμανση ο καρπός είναι πολύ ευαίσθητος και για ατό χρειάζεται προσοχή
- Κριτήρια ωριμότητας:
  - Μέγεθος
  - Χρώμα (όχι τόσο στη νεκταρινιά)
  - Ευκολία απόσπασης
  - Ημέρες από την πλήρη άνθιση
- Στις κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες
  - Χρώμα φλοιού και σάρκας
  - Καρποί πρώιμων ποικιλιών ωριμάζουν από έξω προς τα μέσα ενώ το αντίθετο στις όψιμες

- Συγκομιδή από Μάιο – Σεπτέμβριο (και νωρίτερα σε θερμοκήπια)
- Συγκομιδή σε χέρια (2-3)
- Συντήρηση σε χαμηλή θερμοκρασία το πολύ για 2-4 εβδομάδες (φθαρτό προϊόν)

ΠΕΤΡΟΫ

NEPOVPOV

21.2.2006

ΔΕΠΟΥΡΩΣΟΥ

21-2-2006

NETPOVPOV

21 2 2006

~~DETROV POY SOT~~

21 2 2006



ΔΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΩΝ

21 2 2006

DETPOV POY 101

21 2 2006

ΔΕΤΡΟΥΣΤΟΥΝΟΥ

21 2 2006

NETPOV POYNOV

21 2 2006

DETPOZ POYNOV

21 2 2006

ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΩΝ

21 2 2006

ΔΕΤΡΟΥ ΡΟΥΠΑΝΩΝ

21 2 2006

21 2 2006

ДЕПОЗИТОР





DETROVPOYNO

21 2 2006

~~DETPOY~~

21 2 2006

ΔΕΤΡΟΫ ΡΟΥΣΩΝ

29-3-2005

DETROVPOYÓ

29 3 2005

~~DEPOVO~~

29 3 2005

NETROVPOYÓ

29 3 2005

NETPOY



DETROVPOY



ΔΕΤΡΟΥΣ ΡΟΥΣΙΩΝ





16 5 2005

ДЕТРОЙТ



